

2. 病害虫の発生面積及び防除面積等

(単位: ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積		被害面積	年平均発生面積	備考	
			甚	多	中	少	計	実	延				
イネ	19,400 (早期) 3,700 (曾返期) 15,700	苗立枯病			5	45	50	17,000	19,000	5	37		
		苗葉ももち病				10	10	8,500	8,500	0	52		
		穂穂ももち病		10	40	3,050	3,100	8,000	10,000	50	7,560		
		穂穂ももち病		5	15	1,180	1,200	15,000	18,000	20	4,670		
		穂穂ももち病		50	350	11,600	12,000	15,000	18,000	400	11,482		
		穂穂ももち病		2	3	35	40	60	60	5	307		
		穂穂ももち病			10	1,290	1,300	14,000	14,000	10	550		
		穂穂ももち病		50	250	400	8,800	9,500	(0) 300	(0) 600	700	4,800	
		心枯線虫病					50	50	(14,000) 0	(14,000) 0	0	1,415	
		小粒化萎黄		10	40	2,950	3,000	0	0	50	4,200		
		葉萎縮病			5	995	1,000	0	0	5	1,443		
		葉萎縮病				5	5	0	0	0	48		
		葉萎縮病			20	980	1,000	0	0	20	2,991		
		葉萎縮病			5	1,295	1,300	0	0	5	6,070		
		葉萎縮病				50	50	0	0	0	104		
ニカメイチュウ (1)					0	0	0	0	0	30			
ニカメイチュウ (2)					0	0	0	0	0	28			
ヒシロウカ	3	27	270	19,100	19,400	(同)19,400	(同)48,000	300	20,300				
トヒロウカ	5	140	155	19,100	19,400	(同)19,400	(同)75,000	300	18,515				
ヒメトビ			30	6,970	7,000	(同)19,400	(同)58,000	0	6,900				
ヤマク		50	1,000	14,950	16,000	19,400	58,000	0	16,500				
イネハモク					0	0	0	0	0	0			
イネハモク				400	400	0	0	0	450				
イネハモク				50	50	0	0	0	500				
イネハモク		2	18	3,480	3,500	(同)3,000	(同)4,000	20	3,252				
イネハモク				100	100	0	0	0	620				
斑点米	5	115	980	10,900	12,000	14,000	17,000	1,100	8,800				
イチモンシ				500	500	0	0	0	761				
フタオヒ				50	50	0	0	0	63				
イネヨトウ			1	499	500	0	0	1	3,545				
アヲ			1	49	50	50	80	1	406				
コフノ	2	38	460	13,500	14,000	19,400	48,000	500	15,791				
イネミス	5	395	1,345	4,055	5,800	4,500	7,500	400	2,462				
スクミリンゴ	1	9	573	384	967	700	900	583	311				
二条大友	1,400	さび病				90	90	0	0	0			
		どん病		40	160	800	1,000	(同)300	(同)350	200			
		かび病		10	90	1,000	1,100	300	350	100			
		黒脚病				10	10	(同)650	(同)650	0			
		斑大友		1	9	20	20	650	650	0			
アブラムシ類					50	60	0	0	10				
					1,200	1,200	100	100	0				

(単位: ha)

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平 年 発 生 面 積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
深 麦	233	さうびん類 赤黒斑病 斑病 大葉萎縮病		1 1	4 9 1	10 65 90 9 0 0	10 70 100 10 0 0	(同)5 5 5 0 0 0	(同)0 5 5 0 0 0	0 5 10 1 0 0		
		アブラムシ類				200	200	0	0	0		
小 麦	3,350	さうびん類 赤黒斑病 斑病 大葉萎縮病		3 10 50	7 40 950	2,690 1,380 1,800 10 0	2,700 1,430 2,800 10 0	(同)0 400 400 500 0	(同)0 500 500 500 0	10 50 1,000 0 0	435 2,021 2,318 599 138	平年発生面積は大麦を含む
		アブラムシ類				3,100	3,100	0	0	0	573	
伴作 ジャガイモ	5,600	疫 病	3	50	417	2,500	3,000	5,300	15,000	500	-	
		ジャガイモガガ類 食葉性ヤシ アブラムシ類		1 2 2	10 3 8 4	590 726 90 4,093	600 730 100 4,100	(同)4,400 (同)4,400 (同)4,400 4,400	(同)6,000 (同)6,000 (同)6,000 6,000	10 4 10 7	- - - -	
扶作 ジャガイモ	2,300	疫 病	1	30	69	640	740	1,700	2,000	100	-	
		ジャガイモガガ類 食葉性ヤシ アブラムシ類		1 15 1	5 2 134 2	395 297 1,350 1,697	400 300 1,500 1,700	(同)2,000 (同)2,000 (同)2,000 2,000	(同)5,000 (同)5,000 (同)5,000 5,000	5 3 150 3	- - - -	
サツマイモ	1,700	イモキハカシハスモンヨトウ	1	4	10 10	1,495 190 590	1,500 200 600	(同)30 (同)30 30	(同)50 (同)50 50	5 10 10	584 336 450	
		紫斑核性病害 立枯と焼モザイク			10 5 5 10 8 5	440 25 25 690 490 15	450 30 30 700 500 20	100 0 0 0 0 0	100 0 0 0 0 0	10 5 5 10 10 5	74 28 26 689 360 5	
ダ イ ズ	1,800	アブラムシ類 コガネムシ類 ハスモンヨトウ類 ハダニ類 タヌキヤマトハエ マヒメヤマトハエ マメシクイ類 シイモシマトライバル類 カメムシ類 ウバ類	410	350	510	1,000 49 500 500 270 200 190 5 20 95	1,000 50 1,800 500 300 200 200 100 500 100	(同)1,000 (同)1,000 1,000 0 500 500 500 500 500 500	(同)2,500 (同)2,500 2,500 0 700 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300	0 1 1,300 0 30 0 10 5 20 5	588 50 1,039 412 425 325 185 265 882 410	

(単位：ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積		被害面積	平年発生面積	備考
			甚	多	中	少	計	実	延			
カンキツ	7,991	そうか病	1	3	36	810	850	6,500	16,000	40	1,674	
		いよう病		5	35	560	600	2,500	4,000	40	1,149	
		黒点病	3	50	947	5,500	6,500	7,000	22,000	1,000	9,263	
		灰色かび病		20	130	650	1,000	(同)7,000	(同)10,000	150	1,073	
		炭そ			30	270	300	0	0	30	414	
		ヤノカイカラムシ			20	780	800	(同)7,500	(同)10,000	20	1,677	
		ミカンハタニ	10	50	340	3,700	4,100	7,950	37,000	400	8,310	
		チャノキイロアザミクマ		5	65	4,430	4,500	(同)7,900	(同)15,000	70	2,352	
		カメムシ類	1	20	129	2,450	2,600	1,800	2,300	150	1,269	
		ロウムシ類			1	49	50	(同)1,000	(同)1,500	1	341	
マムカイカラムシ		1	19	250	270	(同)1,000	(同)1,500	20	185			
ミカンハモク'リカ'		2	28	770	800	700	1,000	30	212			
コ'マク'ラカミキリ			5	295	300	(同)1,000	(同)1,500	5	596			
ビワ	751	がんしゅ病		2	38	540	580	700	1,300	40	520	
		斑病		1	14	385	400	100	100	15	140	
		ごま色斑病				5	5	10	12	0	27	
		ナシヒメシンクイ			10	440	450	700	900	10	501	
ブドウ	223	晩腐病			3	37	40	220	900	3	120	
		び斑病				5	5	100	200	0	5	
		褐斑病			2	28	30	150	300	2	38	
		黒とう病	2	13	105	120	220	1,100	15	80		
		べと病			5	35	40	(同)150	(同)300	5	45	
		戻色かび病			5	25	30	200	400	5	80	
		うど病				40	40	100	150	0		
		フ'ト'ウスカザハ'			1	14	15	(同)50	(同)50	1	15	
		フ'ト'ウトラカミキリ			1	29	30	200	200	1	120	
		フタテンヒメヨコハ'イ				10	10	(同)100	(同)200	0	10	
チャノキイロアザミクマ			10	110	120	200	600	10	150			
ナシ	137	黒斑病			3	77	80	130	1,300	3	105	
		黒斑病			1	29	30	130	800	1	75	
		赤斑病			2	68	70	130	500	2	80	
		うど病				80	80	(同)100	(同)400	0	80	
		輪紋病				15	15	100	300	0	15	
		ナシヒメシンクイ			5	45	50	100	300	5	50	
		ハダニ類	1	4	95	100	130	250	5	100		
		カメムシ類		3	37	40	100	300	3	25		
		アブラムシ類		8	102	110	100	300	8	90		
		ナシホソ		1	49	50	100	200	1	50		
チャ	853	炭そ病		5	145	270	420	800	2,500	150	458	
		もろ病			15	75	90	(同)800	(同)2,500	15	115	
		黒赤病			5	45	50	(同)500	(同)2,000	5	60	
		炭そ病			40	110	150	200	500	40	160	
		チャノココモンハマキ		2	28	590	620	800	3,500	30	578	
		チャノホソガ		2	28	370	350	(同)800	(同)3,000	30	437	
		カンシ'ワハタ'ニ	15	135	450	600	800	2,500	150	524		
		ミト'リヒメヨコハ'イ		3	117	430	560	(同)800	(同)2,000	120	626	
		チャノキイロアザミクマ		1	19	430	450	(同)800	(同)2,000	20	490	
		クワシロカイカラムシ		3	12	65	80	80	150	15	123	

(単位 : ha)

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平 年 発 生 面 積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延				
冬 春 トマト (元 年 植 付)	54	疫 色 か び 病 灰 色 か び 病 モザイク病		1	12	2	2	54	100	0	11		
				1	1	25	38	54	160	13	36		
					29	30	54	100	1	-			
					1	1			0	3			
		アブラムシ類 オンシツコナシ ラミ			1	2	3	54	100	1	31		
					2	10	12	40	60	2	18		
冬 春 キュウリ (元 年 植 付)	46	べ と 病 炭 灰 色 か び 病	1	5	21	18	45	46	380	27	28		
				1	4	2	2	(同)46	(同)200	0	1		
						35	40	46	400	5	43		
						2	2	2	5	5	0	2	
						13	15	30	40	140	15	22	
						7	18	25	25	30	7	30	
		アブラムシ類 オンシツコナシ ラミ ミナミキイロアザミ ウミ			1	4	5	46	140	1	28		
					10	10	35	70	0	-			
					15	25	40	160	10	-			
					1	1	1	(同)46	(同)140	0	-		
スイカ	575	つ る 枯 病 炭 疫 そ 病 モザイク病	1	2	32	35	70	(同)550	(同)1,300	35	166		
				1	8	26	65	100	550	35	187		
					3	7	70	80	10	10	119		
					4	4			0	6			
		アブラムシ類 アハダニムシ ハダニ ミナミキイロアザミ ウミ		5	25	470	500	550	1,000	30	408		
					2	23	325	300	500	25	321		
					1	4	95	100	(同)550	5	102		
					1	8	54	63	(同)1,080	9	-		
								130	250		-		
メロン	444	べ つ と 病 つ る 枯 病 疫 そ 病 モザイク病	1	4	15	60	100	440	1,400	20	76		
					2	48	50	(同)440	(同)1,400	2	-		
					3	12	45	50	10	20	15	-	
					2	8	90	100	300	400	10	65	
					5	55	60	80	100	5	75		
			1	1	3	30	35			5	24		
		アブラムシ類 アハダニムシ ハダニ ミナミキイロアザミ ウミ		1	4	195	200	440	800	5	-		
					1	1	129	130	200	1	254		
					1	16	56	75	410	19	-		
春 ハクサイ	130	軟 腐 病 白 斑 と 病 べ 根 斑 と 病 黒 根 モザイク病		1	2	7	10	10	10	3	15		
					1	9	10	100	200	1	12		
					1	4	5	(同)100	(同)200	1	5		
					1	19	20	30	30	1	-		
					1	4	5	(同)100	(同)200	1	6		
					1	1	1			0	-		
		アブラムシ類 アコト			2	8	10	(同)90	(同)150	2	13		
					1	14	50	120	200	15	-		
					4	16	20	(同)120	(同)200	4	40		
秋 冬 ハクサイ (元 年 播 種)	301	軟 腐 病 白 斑 と 病 べ 根 斑 と 病 黒 根 モザイク病	2	18	60	100	70	100	20	69			
			3	27	220	250	160	380	30	162			
			1	14	35	50	(同)160	(同)380	15	50			
				10	40	50	(同)160	(同)380	10	43			
					2	3	5	5	1	-			
					1	1	1		0	1			

(単位：ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積		平年発生面積	備考
			甚	多	中	少	計	実	延		
秋冬 ハクサイ (元年播種)		アブラムシ類	1	5	70	105	180	(同) 210	(同) 380	75	238
		コナガ		3	66	80	140	280	500	60	165
		ヨトウガ			14	145	160	(同) 280	(同) 500	15	146
		ハイマダラノメイガ			1	29	30	(同) 210	(同) 380	1	53
ショウガ	235	モザイク病			1	9	10			1	81
		白星病			2	78	80	150	300	2	-
		軟枯病		1	2	57	60	150	300	3	25
		根茎腐敗病	1	2	12	25	40	150	200	15	75
		メイガ類		3	12	185	200	200	400	15	161
		ハスモンヨトウ類	1	3	11	125	140	(同) 200	(同) 400	15	-
		アブラムシ類				8	8	(同) 200	(同) 400	0	-