

2 発生面積及び防除面積

(単位:ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
水稻 (早期)	2,300	苗いもち			5	3	3	* 1,600	* 1,600
		葉いもち			5	215	220	1,300	1,500
		穂いもち			5	205	210	2,100	2,100
		紋枯病		1	9	740	750	2,100	2,100
		白葉枯病					0	0	0
		ばか苗病				70	70	1,600	1,600
		もみ枯細菌病					0	0	0
		こま葉枯病			90	630	720	* 1,600	* 1,600
		黄化萎縮病					0	0	0
		縞葉枯病	1	4	170	1,425	1,600	-	-
		萎縮病					0	-	-
		ニカメイガ					0	0	0
		セジロウンカ				2,100	2,100	* 2,100	* 3,200
		トビロウンカ				630	630	2,100	3,200
		ヒメトビウンカ	270	540	540	900	2,250	* 2,100	* 3,200
		ツマグロヨコバイ			65	1,235	1,300	* 2,100	* 3,200
		イネゾウムシ			5	895	900	* 2,100	* 2,200
		イネクロカメムシ			5	395	400	200	200
		斑点米カメムシ類			150	770	920	2,100	3,800
		イチモンジセセリ			5	495	500	* 2,100	* 2,100
		フタオビコヤガ			5	195	200	* 2,100	* 2,100
		イネヨトウ				50	50	* 2,100	* 2,100
		アワヨトウ				20	20	* 2,100	* 2,100
		コブノメイガ			10	2,190	2,200	2,100	2,100
		イネミズゾウムシ			50	1,410	1,460	2,100	2,200
水稻 (普通期)	12,000	苗いもち			10	10	10	* 7,500	* 7,500
		葉いもち	1	24	150	2,165	2,340	11,000	11,000
		穂いもち		5	15	1,180	1,200	10,500	10,500
		紋枯病		30	250	5,450	5,730	11,200	11,800
		白葉枯病					0		
		ばか苗病		1	4	415	420	7,500	7,500
		もみ枯細菌病				600	600	* 1,500	* 1,500
		こま葉枯病		5	90	3,145	3,240	* 7,500	* 7,500
		黄化萎縮病					0	0	0
		縞葉枯病	50	105	175	8,790	9,120	-	-
		萎縮病					0	-	-
		ニカメイガ					0	0	0
		セジロウンカ				8,700	8,700	* 11,800	* 29,500
		トビロウンカ		1	1	4,598	4,600	11,800	29,500
		ヒメトビウンカ			200	10,600	10,800	* 11,800	* 29,500
		ツマグロヨコバイ				5,730	5,730	* 11,800	* 29,500
		イネゾウムシ			5	975	980	* 8,500	* 8,600
		イネクロカメムシ		1	14	985	1,000	250	250
		斑点米カメムシ類		5	195	1,900	2,100	11,000	17,000
		イチモンジセセリ			20	1,700	1,720	* 11,800	* 23,600
		フタオビコヤガ			30	2,060	2,090	* 11,800	* 23,600
		イネヨトウ				100	100	* 11,800	* 23,600
		アワヨトウ				30	30	* 11,800	* 23,600
		コブノメイガ	1	4	500	10,595	11,100	11,800	23,600
		イネミズゾウムシ			5	1,465	1,470	8,500	8,600
		スクミリンゴガイ	50	700	750	2,290	3,790	1,800	1,800
麦	1,690	さび病類	0	0	0	30	30	0	0
		うどんこ病	0	0	40	60	100	* 1,650	* 3,200
		赤かび病	0	0	0	150	150	1,650	3,200
		黒穂病類	0	0	8	1,260	1,268	350	350
		斑葉病	0	0	0	300	300	* 350	* 350
		小麦縞萎縮病	0	0	0	0	0	0	0
		大麦縞萎縮病	0	0	0	30	30	0	0
		株腐病	0	0	0	0	0	0	0
		アブラムシ類	0	20	135	1,113	1,268	25	25
		紫斑病				30	30		
		べと病	5	5	40	210	260	0	0
大豆	380	葉焼病	0	0	90	200	290	0	0
		モザイク病				0	0		
		アブラムシ類	0	0	90	200	290	* 300	* 300
		コガネムシ類	0	0	0	30	30	30	30
		ハスモンヨトウ	0	0	10	300	310	300	1,000
		ダイズサヤタマバエ	0	0	20	80	100	* 300	* 1,000
		ヒメサヤムシ類	0	0	10	90	100	* 300	* 1,000
		マメシンクイガ	0	0	0	80	80	* 300	* 1,000
		シロイチモジマダラメイガ	0	0	0	100	100	* 300	* 1,000
		ウワバ類	0	0	0	190	190	* 300	* 1,000
		カメムシ類	5	5	10	230	250	* 300	* 1,000

(単位:ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
ばれいしょ	4,090 春作:3,030 秋作:1,060	疫病	-	10	20	100	130	2,800	5,600
		葉巻病	-	-	-	1	1	-	-
		アブラムシ類	-	2	98	2,850	2,950	4,000	7,500
		ニジュウホシテントウ	-	-	5	265	270	* 4,000	* 7,500
		食葉性ヤガ類	-	-	40	745	785	* 4,000	* 7,500
冬春トマト (2007年植付)	110	疫病	-	-	-	3	3	110	250
		灰色かび病	-	3	10	60	73	110	610
		モザイク病	-	-	-	1	1	-	-
		アブラムシ類	-	-	-	9	9	110	110
		コナジラミ類	-	-	-	110	110	660	660
冬春きゅうり (2007年植付)	41	べと病	-	1	2	20	23	41	200
		炭疽病	-	-	-	3	3	5	10
		うどんこ病	-	1	3	30	34	41	160
		斑点細菌病	-	-	-	7	7	10	14
		モザイク病	-	-	-	1	1	-	-
		アブラムシ類	-	-	-	3	3	* 41	* 60
		シミキロアザミウマ	-	2	5	13	20	41	150
		コナジラミ類	-	3	7	31	41	41	140
		軟腐病	-	-	-	10	10	130	260
		白斑病	-	-	3	16	19	130	260
秋冬はくさい (2007年植付)	187	べと病	-	-	1	9	10	* 130	* 260
		黒斑病	-	-	-	6	6	* 130	* 260
		モザイク病	-	-	-	1	1	-	-
		アブラムシ類	-	-	-	63	63	* 187	* 560
		コナガ	-	-	-	75	75	* 187	* 560
		ヨトウガ	-	-	-	56	56	187	560
		ハマダラメイト	-	-	-	19	19	* 187	* 560
		白色疫病	-	-	5	70	75	558	1,700
		べと病	-	1	20	159	180	558	1,700
		ホトリウス葉枯症	-	-	-	40	40	-	-
たまねぎ (2007年植付)	558	ネギアザミウマ	-	1	20	479	500	550	1,000
		灰色かび病	-	-	10	28	38	260	390
		菌核病	-	3	17	130	150	* 260	* 390
		萎黄病	-	-	-	1	1	-	-
		アブラムシ類	-	-	3	76	79	* 528	* 1,200
冬レタス (2007年植付)	528	ネキリムシ類	-	-	-	5	5	260	260
		ハスモンヨトウ	-	2	10	110	122	528	1,200
いちご (2007年植付)	294	炭疽病	-	1	2	40	43	294	900
		萎黄病	-	1	1	19	21	240	240
		うどんこ病	-	-	-	46	46	294	2,400
		灰色かび病	-	-	1	75	76	294	830
		アブラムシ類	-	-	5	110	115	294	440
		ハダニ類	-	1	7	139	147	294	1,200
		ハスモンヨトウ	-	1	19	250	270	294	860
かんきつ	4,354	そうか病	0	5	30	300	335	3,800	7,600
		黒点病	0	40	300	2,000	2,340	4,000	16,000
		かいよう病	5	25	270	1,600	1,900	3,300	4,600
		灰色かび病	0	5	100	1,000	1,105	* 4,000	* 4,800
		ヤノネカイガラムシ	0	0	10	100	110	* 2,650	* 3,975
		ミカンハダニ	0	50	200	2,200	2,450	4,000	8,000
		ミカンサビダニ	0	0	30	170	200	4,000	8,000
		カメムシ類	0	50	500	3,000	3,550	4,000	15,000
		チャノキアザミウマ	5	30	335	1,750	2,120	* 4,000	* 12,000
		マルカイガラムシ類	0	0	15	100	115	* 2,650	* 3,975
		ロウムシ類	0	0	2	38	40	100	100
		ゴマダラカミキリ	0	10	100	150	260	* 1,800	* 2,400
		クワゴマダラヒトリ	0	0	10	200	210	100	100
		アブラムシ類	0	0	100	1,350	1,450	* 4,000	* 8,000
びわ	610	がんしゅ病	0	10	40	250	300	430	650
		灰斑病	0	30	180	390	600	450	680
		ナシヒメシンクイ	0	0	30	570	600	400	400
		カメムシ類	0	0	0	0	0	0	0
なし	82	黒星病	0	5	10	35	50	80	560
		赤星病	0	0	5	30	35	80	160
		うどんこ病	0	0	0	15	15	* 80	* 140
		輪紋病	0	0	0	15	15	80	140
		ナシヒメシンクイ	0	0	5	25	30	80	160
		ハダニ類	0	0	5	35	40	80	160
		カメムシ類	0	1	5	24	30	60	120
		アブラムシ類	2	5	15	40	62	80	210

(単位:ha)

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
ぶどう	125	晩腐病	0	0	0	15	15	120	160
		うどんこ病	0	0	0	10	10	* 120	* 240
		褐斑病	0	0	5	15	20	* 120	* 240
		黒とう病	3	5	15	40	63	120	550
		べと病	5	15	30	65	115	120	360
		灰色かび病	0	0	5	10	15	120	360
		チャノキイロアザミウマ	0	5	20	75	100	120	480
茶	757	炭そ病	5	15	50	460	530	750	1,500
		もち病	0	0	0	10	10	* 360	* 720
		チャノコカクモンハマキ	0	50	100	420	570	750	2,250
		チャノホソガ		30	80	410	520	* 750	* 2,250
		チャノミドリヒメヨコバイ	10	60	200	440	710	* 750	* 3,000
		カンザワハダニ	0	5	30	195	230	750	2,250
		チャノキイロアザミウマ	15	50	180	465	710	* 750	* 2,250
		クワシロカイガラムシ	0	10	30	480	520	750	1,125

注) 防除面積の* は同時防除