

表1 令和7年産春作ジャガイモ疫病の予測初発・防除開始時期（出芽50%想定日2月15日）

令和7年4月4日現在

		諫早市		西海市	島原市	雲仙市			南島原市			平戸市	五島市	壱岐市
		飯盛町 （後田）	飯盛町 （山口）	西海町	有明町	愛野町	小浜町	南串山町	加津佐町	口之津町	有家町	紐差町	三井楽町	石田町
4月	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													

注1）予測時期はFLABS-Nに1 kmメッシュ農業気象データを入力し算出した。

注2）表内の色が塗られた部分  は防除開始時期（予測初発日の8～10日前）を、
斜線部分  は予測初発時期（予測初発日の前後5日間）を示す。

注3）新しく基準値に達した地点は赤色で示している。

表2 令和7年産春作ジャガイモ疫病の予測初発・防除開始時期（出芽50%想定日3月1日）

令和7年4月4日現在

		諫早市		西海市	島原市	雲仙市			南島原市			平戸市	五島市	壱岐市
		飯盛町 (後田)	飯盛町 (山口)	西海町	有明町	愛野町	小浜町	南串山町	加津佐町	口之津町	有家町	紐差町	三井楽町	石田町
4月	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													

注1) 予測時期はFLABS-Nに1kmメッシュ農業気象データを入力し算出した。

注2) 表内の色が塗られた部分  は防除開始時期（予測初発日の8～10日前）を、
斜線部分  は予測初発時期（予測初発日の前後5日間）を示す。

注3) 新しく基準値に達した地点は赤色で示している。