

# 注 意 報

長崎県病虫害防除所長

## 令和2年度病虫害発生予察 注意報第2号


### 果樹共通 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ）

1. 発生地域（対象地域） 県内全域

2. 発生程度 やや多

#### 3. 注意報発令の根拠

- (1) 本年の越冬量は、平年より多い（1.56頭/m<sup>2</sup>、平年0.28頭/m<sup>2</sup>、令和2年2月17日付、令和元年度発生予察技術情報第3号より）。
- (2) 5月前期の巡回調査の結果、かんきつでは発生圃場率は2.8%（平年0.7%）であったが、なし、びわでは発生を認めなかった。
- (3) フェロモントラップにおける誘殺数は、4地区とも4月6半旬から5月1半旬より飛来の増加が確認され、うち3地区では平年より多い誘殺数が確認されている（図1）。
- (4) 病虫害防除員等の報告によると一部のかんきつ、なし、びわ園で飛来が見られる。
- (5) 本年4月4半旬より県予察圃場（諫早市小船越町B）に新たに設置したフェロモントラップにおいても、5月1半旬より誘殺数が大幅に増加している（図2）。






図2 【参考】チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネコール)

#### 4. 防除対策

- (1) 飛来時期や飛来数は園によって差があるので、こまめに見廻って早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除する。
- (2) ハウス栽培では、開口部を防虫網（4mm目以下）で被覆し、侵入を防ぐ。また既に被覆済みのハウスでは、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (3) なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
- (4) 特に収穫時期の近い品目は農薬使用基準に留意する。

- 
- 長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。  
「長崎県防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>
  - この情報に関するお問い合わせ  
長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

