

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

令和3年度病害虫発生予察防除情報第2号

かんきつ ミカンハダニの防除対策について

現在、かんきつにおけるミカンハダニの発生が多く、今後も同様の状況が続くと予想されます。ハダニ類の密度を下げるため、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) 4月前期の巡回調査（36筆）の結果、寄生葉率は6.4%（平年 2.8%）、発生圃場率は61.1%（平年 25.7%）と平年より高く（図1、2）、一部多発圃場が見られる。
- (2) 気象予報（福岡管区气象台、令和3年4月15日発表）によると、向こう1か月の気温は高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 ミカンハダニ 寄生葉率




図2 ミカンハダニ 発生圃場率

2. 防除対策

- (1) 樹勢低下などにより冬季のマシン油乳剤の散布を控えた圃場などは、発生が多くなるおそれがあるので、注意する。
- (2) 薬剤散布の際は、薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。
- (3) 薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統（令和3年長崎県病害虫防除基準P388～391（みかん）およびP396～399（かんきつ）の「作用機構による分類（IRAC）」参照）の薬剤を連用しない。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス：<http://www.jpnpn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所）TEL：0957-26-0027

