令和４年４月５日

防　除　情　報

長崎県病害虫防除所長

令和４年度病害虫発生予察防除情報第１号

いちご　アザミウマ類（本圃）の防除対策について

現在、いちごの本圃におけるアザミウマ類が増加傾向にあります。アザミウマ類の密度を下げるため、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

１．発生状況等

（１）３月後期の巡回調査（２７筆）の結果、寄生花率は６．１％（過去６か年平均　４．１％）、発生圃場率は６６．７％（同　４６．２％）であった（図１、２）。

（２）気象予報（福岡管区気象台、令和４年３月３１日発表）によると、向こう１か月の気温は平年並か高い見込みであり、本虫の発生に好適である。



図1　いちご　アザミウマ類　寄生花率



図2　いちご　アザミウマ類　発生圃場率

２．防除対策

（１）発生が多くなってからの防除は困難であるので、早期発見・早期防除に努める。

（２）本虫は薬剤が到達しにくい蕾や花、がく等に寄生しているため、丁寧に薬剤散布を行い薬液がかかるようにする。

（３）薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統の薬剤（令和４年長崎県病害虫防除基準Ｐ２１６～２１９の「作用機構による分類（ＩＲＡＣ）」参照）を連用しない。

（４）ミツバチへの影響日数を確認してから薬剤選定、散布を行う。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。
「長崎県農林技術開発センター　環境研究部門　病害虫発生予察室
（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス：http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/
○この情報に関するお問い合わせ
長崎県農林技術開発センター　環境研究部門　病害虫発生予察室
（長崎県病害虫防除所）　ＴＥＬ：0957-26-0027