

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

令和6年度病害虫発生予察防除情報第8号

果樹共通 カメムシ類 (チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) の防除対策について

果樹カメムシ類の発生が平年より多い地域が見受けられます。下記の点に注意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) 6月前期の巡回調査の結果、かんきつでは発生を認めなかった(平年 発生圃場率0.7%)、また、びわにおいても発生を認めなかった(平年 発生を認めない)。
- (2) フェロモントラップにおける誘殺数は、諫早市では6月3半旬に飛来の増加が確認され、平年より誘殺数が多い(図1)。




図1 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネネール)

2. 防除対策

- (1) 飛来時期や飛来数は圃場によって差があるので、こまめに見廻って早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除する。
- (2) ハウス栽培では、開口部を防虫網(4mm目以下)で被覆し、侵入を防ぐ。被覆済みのハウス

- では、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (3) なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
 - (4) 収穫時期の近い品目は農薬使用基準に留意する。
-

○6月から8月までの3か月間を「農薬危害防止運動月間」と定め、農薬事故を防止する運動を実施しています。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス

: <https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/JPP/index.html>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室
(長崎県病害虫防除所) TEL : 0957-26-0027

