防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

平成24年度病害虫発生予察防除情報第5号

果樹カメムシの防除対策について

本年の越冬量及びフェロモントラップへの誘殺数は平年並となっていますが、一部の 園では飛来が認められています。

向こう1か月の気温は平年より高い見込みであり、今後ハウスみかん、びわ、なし等へ飛来し、被害を受けるおそれがありますので、下記の点に留意して防除の徹底をお願いします。

記

1. 発生状況

(1)フェロモントラップ調査(諫早市小船越町、多良見町、南島原市有家町及び西海市西彼町)による誘殺数は、平年並で推移している(図)。




図 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネコール)

- (2)県予察圃場(かんきつ、びわ)における調査では、5月2半旬に飛来が認められている。
- (3)防除員の報告によると、一部のかんきつ園及びびわ園では5月2半旬に飛来が認められている。

2. 防除対策

(1) 飛来時期や飛来数は園によって差があるので、こまめに見まわって早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除する。

- (2)ハウス栽培では、開口部を防虫網(4mm目以下)で被覆し、侵入を防ぐ。また既に被覆済みのハウスでは、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (3)なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
- (4)特に収穫時期の近い品目は農薬使用基準に留意する。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。 「防除所ホームページ」 アドレス:http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/ この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL: 0957-26-0027