

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

平成26年度病害虫発生予察防除情報第13号

きゅうり ミナミキイロアザミウマの防除対策について

きゅうりのミナミキイロアザミウマの発生が多い傾向です。本虫は、キュウリ黄化えそウイルス(MYSV)を媒介しますので、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) 1月上旬の巡回調査(12筆)の結果、寄生葉率は3.0%(平年0.2%)、発生圃場率は41.7%(平年11.1%)と平年より多い発生であった(図1、2)。
- (2) 向こう1か月の気温は平年並か高い見込みであり本虫の発生に好適である。




図1 キュウリミナミキイロアザミウマ 発生圃場率の推移




図2 キュウリミナミキイロアザミウマ 寄生葉率の推移

2. 防除対策

- ハウス内および周辺の雑草は生息・増殖源となるので除去し、環境衛生に努める。
- キュウリ黄化えそウイルスの伝染環を遮断するため、本虫が誘引される青色(もしくは黄色)の粘着トラップを施設内に設置して早期発見し、初期防除に努める。
- 薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統の薬剤を連用しない。
- 栽培終了時に密閉陽熱処理等によって死滅させ、施設外への分散を防ぐ。

長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jpnp.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL: 0957-26-0027