

防除情報

長崎県病害虫防除所長

平成30年度病害虫発生予察防除情報第5号

果樹カメムシ類の防除対策について

本年の越冬量は平年並（1㎡あたり0.35頭（平年0.31頭））でしたが、5月中旬からフェロモントラップへの飛来が多くなっています。

今後ハウスみかん、びわ、なし等へ飛来するおそれがありますので、下記の点に留意して防除の徹底をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) フェロモントラップにおける誘殺数は、南島原市有家町、諫早市小船越町では5月3半旬に増加している（図）。
- (2) 病害虫防除員等の報告によると一部のかんきつ、なし、びわ園で飛来が見られる。




図 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネコール)

2. 防除対策

- (1) 飛来時期や飛来数は園によって差があるので、こまめに見廻って早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除する。
- (2) ハウス栽培では、開口部を防虫網（4mm目以下）で被覆し、侵入を防ぐ。また既に被覆済みのハウスでは、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (3) なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
- (4) 特に収穫時期の近い品目は農薬使用基準に留意する。

-
- 長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。
「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>
 - この情報に関するお問い合わせ
長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

