

# 防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

令和元年度病害虫発生予察防除情報第24号

## 茶 カンザワハダニの防除対策について

現在、茶におけるカンザワハダニが多い傾向にあり、卵およびふ化幼虫も確認されています。暖冬の影響により、発生密度が平年を上回ることが予想されるため、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

### 記

#### 1. 発生状況等

- (1) 3月前期の巡回調査（16筆）の結果、寄生葉率は3.3%（平年1.5%）、発生圃場率は56.3%（平年25.1%）であった（図1、2）。
- (2) 気象予報（福岡管区气象台、令和2年3月12日発表）によると、向こう1か月の気温は高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 カンザワハダニ・寄生葉率の推移




図2 カンザワハダニ・発生圃場率の推移

#### 2. 防除対策

- (1) 春期の防除適期は、ふ化幼虫の発生初期であるので、圃場での発生状況を確認し防除を行う。摘採時期が近づいているので農薬使用基準に注意する。
- (2) 薬剤のかけむらがあると防除効果が落ちるので、葉裏まで十分にかかるように丁寧に散布する。
- (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統薬剤の連続散布を避け、異なる系統の薬剤（平成31年長崎県病害虫防除基準P434～437の「作用機構による分類（IRAC）」参照）をローテーション散布する。

- 
- 長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。  
「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jpnpn.ne.jp/nagasaki/>
  - この情報に関するお問い合わせは、電話でお願いします  
長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

