

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

令和元年度病害虫発生予察防除情報第14号

アスパラガス アザミウマ類の防除対策について

アスパラガスにおいてアザミウマ類の発生が多い傾向です。発生圃場においては今後収穫物への被害の増加が予想されますので、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況等

- (1) 9月前期の巡回調査(12筆)の結果、払い落とし虫数(10.5cm×22.5cmの白色板に5回×10ヶ所)は18.3頭(平年4.6頭)、発生圃場率は66.7%(平年53.9%)で(図1、2)、一部多発圃場が見られた。
- (2) 気象予報(福岡管区气象台、令和元年9月12日発表)によると、向こう1か月の気温は高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 アザミウマ類 払い落とし虫数の推移
※払い落とし虫数は成虫、幼虫の合計




図2 アザミウマ類 発生圃場率の推移

2. 防除対策

- (1) 施設内および周辺の雑草は生息・増殖源となるので除去する。
- (2) 薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統(平成31年長崎県病害虫防除基準P288~289の「作用機構による分類(IRAC)」参照)の薬剤を連用しない。
- (3) 本虫は多発すると防除が困難になるので、発生を確認した場合は速やかに防除をおこなう。薬剤の散布にあつては、茎葉の内部まで十分に薬液が付着するよう丁寧におこなう。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jpnn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

