

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

令和2年度病害虫発生予察防除情報第14号

茶 カンザワハダニの防除対策について

現在、茶におけるカンザワハダニが多い傾向にあり、卵およびふ化幼虫も確認されています。今後の気象条件により、発生密度が平年を上回ることが予想されるため、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

記

1. 発生状況等

- (1) 3月前期の巡回調査（15筆）の結果、寄生葉率は3.3%（平年1.8%）、発生圃場率は40.0%（平年28.2%）であった（図1、2）。
- (2) 気象予報（福岡管区气象台、令和3年3月11日発表）によると、向こう1か月の気温は高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 カンザワハダニ・寄生葉率の推移




図2 カンザワハダニ・発生圃場率の推移

2. 防除対策

- (1) 春期の防除適期は、ふ化幼虫の発生初期であるので、圃場での発生状況を確認し防除を行う。摘採時期が近づいているので農薬使用基準に注意する。
- (2) 薬剤のかけむらがあると防除効果が落ちるので、葉裏まで十分にかかるように丁寧に散布する。
- (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統薬剤の連続散布を避け、異なる系統の薬剤（令和2年長崎県病害虫防除基準P428～431の「作用機構による分類（IRAC）」参照）をローテーション散布する。

-
- 長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。
「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>
 - この情報に関するお問い合わせは、電話でお願いします
長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

