

技術情報

長崎県病害虫防除所長

平成19年度病害虫発生予察技術情報第2号

茶のクワシロカイガラムシの防除対策について

第3世代の防除時期が近づいています。下記の点を参考にして防除指導をお願いします。

記

防除対策

- 1 本虫は年3回発生するが、それぞれの世代のふ化盛期が防除適期である。
- 2 1回脱皮してロウ質のカイガラを作りはじめると薬剤の効果が低下するので、下表の第3世代予測ふ化盛期当日～5日後に散布する。なお、独自にピーク日を現地調査し防除適期を判断している地域ではその判断を優先する。
- 3 株内の枝や株元に薬液がかかるように十分量散布する。
- 4 発生を認めていない園でも新たな発生に注意する。
- 5 薬剤散布に当たっては、使用基準を遵守する。

表 クワシロカイガラムシ第3世代のふ化盛期予測日

地区名	東彼杵 赤木	東彼杵 太の原	世知原 板山	世知原 木浦原	五島 大津
平成19年	9/15	9/19	9/24	9/13	9/4

注1：ふ化盛期予測日は「有効積算温度則による防除適期予測法（東彼杵茶業支場）」により算出した。

注2：使用する気温データには、ながさき農林業情報システム500mメッシュ気象データを利用した。

注3：平成19年9月3日現在で予測し（1月1日～9月2日まで実測値）、9月3日以降のデータは過去10年間の平均値を利用した。

注4：第3世代の予測値は、現地調査による第2世代のふ化最盛期日以降の有効積算温度による（世知原板山のみ第1世代のふ化最盛期日以降の有効積算温度による）。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

「防除所ホームページ」を利用して、ながさき農林業総合情報システム（一部会員制、アドレス：<http://www.n-nourin.jp/>）やその他の情報を閲覧することができます。

この情報に関するお問い合わせは、電話またはEメールでお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027， Eメール：kngs0301@sp.jppn.ne.jp