

平成 2 1 年 5 月 2 9 日

技 術 情 報

長崎県病虫害防除所長

平成 2 1 年度病虫害発生予察技術情報第 1 号

露地びわのナシマルカイガラムシの防除対策について

本虫の第 1 世代の発生時期を迎えています。下記の点に留意して適期防除をお願いします。

記

1 発生状況

(1) 露地びわにおける第 1 世代 1 齢幼虫の発生ピークは、下表のとおりと予測される。

地点名	長崎	大瀬戸	口之津
発生ピーク	5 / 2 3	5 / 3 0	5 / 2 1
標高 (m)	2 7	4 3	1 0

注 1 : 算出方法は「有効積算温度による発生予測 (平成 2 0 年度農林技術開発センター果樹研究部門成果情報)」により、5 月 2 7 日時点で算出した。

注 2 : 気温データは気象庁アメダスを使用した。

2 防除対策

- (1) 同一地区内の圃場でも標高や土地条件により気温が異なり、発生時期が前後する場合がありますので注意する。
- (2) 発生ピークと収穫時期が重なっているため、収穫終了後速やかに防除する。
- (3) 薬剤は、マシン油乳剤 (ハーベストオイル) または昆虫成長制御剤を使用するが、特に昆虫成長制御剤は防除時期が遅くなると効果が低下するので注意する。また、マシン油乳剤は高温時の散布では薬害を生じる場合があるので注意する。
- (4) 樹冠内部の枝や幹に薬液がかかるように十分量を散布する。

病虫害防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス : <http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病虫害防除所 TEL : 0957-26-0027