

平成23年5月17日

防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

平成23年度病害虫発生予察防除情報第3号

露地びわのナシマルカイガラムシの防除対策について

本虫の第1世代の発生時期を迎えています。下記の点に留意して適期防除をお願いします。

記

1. 発生状況

(1) 露地びわにおける第1世代1齢幼虫の発生ピークは、下表のとおりと予測される。

地点名	長崎	大瀬戸	口之津
発生ピーク予測日	5 / 3 1	6 / 7	5 / 3 1
(前年予測日)	5 / 2 8	6 / 6	5 / 2 6
標高 (m)	2 7	4 3	1 0

注1：算出方法は「有効積算温度による発生予測（農林技術開発センター果樹研究部門）」により、5月15日時点で予測し、5月16日以降のデータは平年値を使用した。

注2：気温は気象庁アメダスデータを使用した。

(2) 5月上旬の巡回調査（10筆）の結果、発生を認めなかった（平年寄生枝葉率0.1%、発生圃場率1.3%）。

2. 防除対策

(1) 同一地域内の圃場でも標高や土地条件により気温が異なり、発生時期が前後する場合があるので注意する。

(2) 発生ピークと収穫時期が重なっているため、収穫終了後速やかに防除する。

(3) 防除薬剤のうち、昆虫成長制御（IGR）剤は防除時期が遅くなると効果が低下するので注意する。また、マシン油乳剤は高温時の散布では薬害を生じる場合があるので注意する。

(4) 樹冠内部の枝や幹に薬液がかかるように十分量を散布する。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jpnpn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027