

課題名	ヤノネカイガラムシ寄生蜂2種の同所放飼効果										
成果の要約	ヤノネキイロコバチとヤノネツヤコバチの両種を同所放飼した場合、1種のみ放飼に比較して、短期間に防除効果が得られる。										
成 績 概 要	第1表 ヤノネカイガラムシの2種寄生蜂の放飼効果										
	放飼場所	放飼天敵種名	ヤ密	天寄	ヤ密	天寄	ヤ密	天寄	ヤ密	天寄	放飼月日、頭数
			ノ	生	ノ	生	ノ	生	ノ	生	
			ネ度	敵率	ネ度	敵率	ネ度	敵率	ネ度	敵率	
			A	B	A	B	A	B	A	B	
			5月		7月		9~11月		9~11月		
	○加津佐町	ヤノネキイロコバチ	3.67	21.4			5.52	33.3			不明(1983.6.29放飼点より約4Km地点)
	○高来町	〃	0.23	31.7			4.08	11.9			1983.7.20キイロ368頭
	×多良見町	〃	0.81	66.4			0.34	24.1			1983.7.6キイロ392頭
	×福江市(島しょ)	ヤノネツヤコバチ	0.16	0	1.13	4.2	0.55	14.1	0.70	21.3	1984.5.22ツヤ雌50頭
×石田町(島しょ)	〃	3.00	0			1.65	0			1984.5.24ツヤ雌約30頭	
×時津町	ヤノネキイロコバチ ヤノネツヤコバチ	11.20	8.5			1.68	34.5			1983.10.20キイロ425頭 1984.4.26ツヤ雌約100頭	
○石田町(島しょ)	〃	0.30	72.2			2.96	*60.1	-	*91.9	1983.7.11キイロ398頭 1984.5.23ツヤ雌約70頭	
○富江町(島しょ)	〃	0.07	0	0.45	10.9	0.12	-	0.15	31.7	1984.7.11キイロ302頭 7.24ツヤ雌46頭	
×上五島町(島しょ)	〃	0.08	0	0.82	1.9	0.37	6.9			1984.5.23キイロ327頭 7.16ツヤ雌46頭	
<p>○ 慣行防除  × ほとんど無防除  * キイロコバチのみ</p> <p>(昭59長崎果試)</p>											