

○UV-B照射ランプを組み合わせたグリーンな栽培体系の防除例

【設置方法】 4m間隔、設置高さ150cm

【照射期間及び時間】 親株定植後～親株栽培終了まで、23時～2時 3時間

①親株圃場（秋菊）

散布時期		薬剤名		倍数	化学組成による分類	RAC	対象病害虫
8月	殺菌剤	ベンレート水和剤	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	1	白さび
9月	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
	殺菌剤	ダコニール1000	予防剤	1000倍	その他	M5	
10月	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび
	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
11月	殺菌剤	ダコニール1000	予防剤	1000倍	その他	M5	
	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび
12月	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび

※あくまで一例のため、実際は圃場をよく観察し適宜散布を行う。

①親株圃場（夏秋菊）

散布時期		薬剤名		倍数	化学組成による分類	RAC	対象病害虫
2月	殺菌剤	ベンレート水和剤	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	1	白さび
3月	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
	殺菌剤	ダコニール1000	予防剤	1000倍	その他	M5	
4月	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび
	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
5月	殺菌剤	ダコニール1000	予防剤	1000倍	その他	M5	
	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび
6月	殺菌剤	ペンコゼブフロアブル	予防剤	800倍	その他	M3	白さび
	殺菌剤	アンビルフロアブル	治療剤	1000倍	ステロール生合成阻害	3	白さび

※あくまで一例のため、実際は圃場をよく観察し適宜散布を行う。