

対馬保健所管内における感染症情報

令和7年 第12週（ 3月17日 ～ 3月23日 ）

1. 定点把握対象疾患

発生状況	疾患名	定点当たり（人）		定点医療機関からの報告数				発生年代等
		前週 (11週)	今週 (12週)	対馬 病院	上対馬 病院	豊玉 診療所	報告 合計	
	(季節性)インフルエンザ	-	-	0	0	0	0	
↓	新型コロナウイルス感染症	7.00	5.00	12	2	1	15	10歳未満：1名 10歳代：0名 20歳代：1名 30歳代：1名 40歳代：0名 50歳代：1名 60歳代：3名 70歳代：2名 80歳以上：6名
	RSウイルス感染症	-	1.00	2	0		2	1歳未満：2名
	咽頭結膜熱	-	-	0	0		0	
↑	A群溶血性链球菌咽頭炎	1.00	3.00	6	0		6	10歳未満：5名 10歳代：1名
	感染性胃腸炎	-	0.50	0	1		1	20歳代：1名
	水痘	-	-	0	0		0	
	手足口病	-	-	0	0		0	
	伝染性紅斑（リンゴ病）	-	-	0	0		0	
	突発性発しん	-	-	0	0		0	
	ヘルパンギーナ	-	-	0	0		0	
	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	-	-	0	0		0	
	細菌性髄膜炎	-	-	-			-	*基幹定点
	無菌性髄膜炎	-	-	-			-	*基幹定点
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-			-	*基幹定点
	クラミジア肺炎【オウム病は除く】	-	-	-			-	*基幹定点
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-			-	*基幹定点

2. 全数把握対象疾患

発生なし


3. トピックス、季節情報

◆国内で麻しん（はしか）の感染事例が増加しています！


全国では、海外渡航者からの輸入症例を契機に、国内における感染伝播事例が報告されています。2025年の第12週までに44件の報告があります。（2024年累積報告数45件）

麻しんを予防するにはワクチン接種が最も有効です。定期の予防接種として麻疹・風疹混合生ワクチン（MRワクチン）を実施していますが、令和6年度のMRワクチンの偏在等に伴い、対象の期間内に定期接種を受けられなかった場合は、対象期間外であっても、定期予防接種として接種していただくことができます。

該当する場合は、対馬市健康増進課へご相談ください。



◆都道府県別 麻しん報告数（2025年第11週）◆



麻しん（はしか）について

麻しんは、麻しんウイルスによる感染力が極めて強い感染症です。

症状：発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など

感染経路：空気感染（飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染

潜伏期間：10～12日間（最大21日間）

治療：特別な治療はなく、対症療法

予防方法：ワクチン接種

※麻しん含有ワクチン接種歴（2回以上の接種）の確認をしておきましょう。